

ABGABE VON KALIUMIODIDTABLETTEN IM ALARMFALL

Kaliumiodid 65 mg Armeepotheke

Information für Abgabeverantwortliche in Gemeinden, öffentlichen Einrichtungen und Betrieben



Die vorliegende Grosspackung ist nur im Alarmierungsfall zu öffnen, wenn die Bevölkerung von den Behörden angewiesen wird, die Iodtabletten bereitzulegen. Gleiches gilt auch für die Verteilung der darin enthaltenen «Kaliumiodidtabletten 65 mg Armeepotheke»!

(Hinweise zu Alarmfällen finden Sie im örtlichen Telefonbuch auf den letzten Seiten unter «Alarmierung der Bevölkerung, Verhalten bei Gefährdung»)

Sobald die Bevölkerung angewiesen wird, die Kaliumiodidtabletten bereitzulegen, müssen die einzelnen Tablettenpackungen (mit 2 x 6 Tabletten) umgehend an alle Mitarbeitenden Ihres Betriebes sowie an alle weiteren Personen verteilt werden, die sich in Ihrem Gebäude aufhalten. Dabei erhält jede Person eine Packung.

Inhalt

Einzelpackungen zu 2 x 6 Tabletten «Kaliumiodid 65 mg Armeepotheke». Grosspackungen enthalten je nach Betriebsgrösse eine genügende Menge Kaliumiodidtabletten.

Zweck

Kaliumiodidtabletten dienen der Schilddrüsenprophylaxe bei einem schweren Kernkraftwerk-Unfall. Rechtzeitig eingenommen verhindern sie, dass über die Atemluft aufgenommenes radioaktives Iod sich in der Schilddrüse anreichert.

Lagerungsbedingungen

Die Tabletten sind in dieser ungeöffneten Grosspackung an einem für Kinder unzugänglichen Ort trocken und bei Raumtemperatur (15–25 °C) aufzubewahren.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Verhalten bei Notfallschutzmassnahmen sowie zur Verteilung und Verwendung von Kaliumiodidtabletten im Alarmfall erhalten Sie unter:

www.kaliumiodid.ch
www.naz.ch

Falls die Behörden nach dem Bereitlegen der Tabletten in gefährdeten Gebieten auch deren Einnahme anordnen, sind sie wie folgt einzunehmen:

«Kaliumiodid 65 mg Armeepotheke» Tabletten sollen mit reichlich Flüssigkeit und möglichst nicht auf nüchternen Magen eingenommen werden. Die Einnahme kann durch Auflösen in einem beliebigen Getränk erleichtert werden (Lösung nicht haltbar, deshalb sofort verbrauchen).

Empfohlene Dosierung

Neugeborene (auch gestillte Säuglinge behandelter Mütter) bis 1 Monat:

¼ Tablette nur einmal am 1. Tag

Kinder ab dem 2. Monat bis 3 Jahre:

½ Tablette pro Tag

Kinder ab dem 4. Jahr bis 12 Jahre:

1 Tablette pro Tag

Kinder über 12 Jahre sowie Erwachsene:

2 Tabletten pro Tag auf einmal einnehmen

Schwangere und Stillende:

2 Tabletten auf einmal pro Tag, an max. 2 Tagen

Die notwendige Dauer der Einnahme wird durch die Behörden bekannt gegeben. (Auch wenn für Kinder und Erwachsene die Einnahme dieser Tabletten mehrere Tage hintereinander angeordnet wird, gelten für Schwangere und Stillende sowie Neugeborene im 1. Lebensmonat die obigen Einschränkungen.)

Das weitere Verhalten

Die Einnahme von Kaliumiodidtabletten schützt nur die Schilddrüse vor radioaktivem Iod, nicht hingegen den Körper vor radioaktiver Strahlung. Daher müssen, sofern die Behörden dazu auffordern, umgehend die zugewiesenen Schutzräume aufgesucht und weitere Anweisungen via Radio und Fernsehen abgewartet werden.

PACKUNG NUR AUF BEHÖRDLICHE
ANORDNUNG ÖFFNEN UND VERTEILEN